



Metoclopramide

Andere naam: Primperan®

Wat is het en hoe werkt het?

Een medicijn tegen ernstige misselijkheid en overgeven door chemotherapie en radiotherapie.

- Neem contact op met je arts of verpleegkundig specialist als de misselijkheid blijft.

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

- Een drank of tablet die via de mond (oraal) ingenomen wordt.
- Een heldere vloeistof die via een ader als infuus (intraveneus) gegeven wordt.

Bijzonderheden

- Het kan nodig zijn de voeding van je kind aan te passen.
- Als je kind binnen 30 minuten na het innemen overgeeft, kijk dan op prinsesmaximacentrum.nl/leefregels onder het kopje medicijnen wat je moet doen.

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Slaperigheid, moeheid, duizeligheid
- Bewegingsstoornissen, zoals stijve spieren, onwillekeurige bewegingen, niet stil kunnen blijven zitten
- Verstopping (obstipatie), diarree
- Lage bloeddruk (bij infuus)

Speciale instructies

- Het is belangrijk dit medicijn volgens schema te geven.
- De tablet of drank begint na een half uur te werken.
- Je kind mag dit medicijn niet langer dan vijf dagen gebruiken.